

| Vacinas | Esquemas e recomendações | Comentários | DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|----------------------|
| | | | Gratuitas nas UBS* | Clínicas privadas de vacinação | |
| RECOMENDADAS | | | | | |
| Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT | Histórico vacinal | Conduta na gestação | <ul style="list-style-type: none"> A dTpa está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a <i>Bordetella pertussis</i> ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser imunizado. A melhor época para a aplicação de dTpa é entre a 27ª e a 36ª semana, pois permite a transferência de maior quantidade de anticorpos maternos para o feto, mas pode ser aplicada a partir da 20ª semana. Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério, o mais precocemente possível. A vacina está recomendada mesmo para aquelas que tiveram coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente. Na falta de dTpa, pode ser substituída por dTpa-VIP, ficando a critério médico o uso <i>off label</i> em gestantes. | SIM, dT e dTpa | SIM, dTpa e dTpa-VIP |
| | Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dTpa (entre a 27ª e 36ª semana de gestação). | | | |
| | Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido apenas uma dose de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada entre a 27ª e a 36ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas. | | | |
| | Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido apenas duas doses de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dTpa (entre a 27ª e 36ª semana de gestação). | | | |
| | Em gestantes com vacinação desconhecida. | Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada entre a 27ª e a 36ª semana de gestação. Adotar esquema 0 - 2 - 4 meses ou 0 - 2 - 6 meses. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas. | | | |
| Hepatite B | Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. | A vacina hepatite B é recomendada para todas as gestantes suscetíveis. | SIM | SIM | |
| Influenza (gripe) | Dose única anual. | A gestante é grupo de risco para as complicações da infecção pelo vírus influenza. A vacina está recomendada nos meses da sazonalidade do vírus, mesmo no primeiro trimestre de gestação. Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, inclusive em gestantes, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V. | SIM, 3V | SIM, 3V e 4V | |
| RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| Hepatite A | Dois doses, no esquema 0 - 6 meses. | É vacina inativada, portanto sem contraindicação. Já que no Brasil as situações de risco de exposição ao VHA são frequentes, a vacinação deve ser considerada. | NÃO | SIM | |
| Hepatite A e B | Para menores de 16 anos: duas doses, aos 0 - 6 meses. A partir de 16 anos: três doses, aos 0 - 1 - 6 meses. | A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B. | NÃO | SIM | |
| Pneumocócicas | Esquema sequencial de VPC13 e VPP23 pode ser feito em gestantes de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>). | <ul style="list-style-type: none"> VPC13 e VPP23 são vacinas inativadas, portanto sem riscos teóricos para a gestante e o feto. | NÃO | SIM | |
| Meningocócica conjugada ACWY | Uma dose. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>). | <ul style="list-style-type: none"> As vacinas meningocócicas conjugadas são inativadas, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto, devendo ser consideradas em situações de risco epidemiológico. Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada. | NÃO | SIM | |
| Meningocócica B | Dois doses com intervalo de um a dois meses. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>). | A vacina meningocócica B é inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto, devendo ser considerada em situações de risco epidemiológico. | NÃO | SIM | |
| CONTRAINDICADAS | | | | | |
| Febre amarela | Contraindicada na gestação. Porém, o médico deve avaliar sua utilização quando os riscos de adquirir a doença superam os riscos potenciais da vacinação. | <ul style="list-style-type: none"> Gestantes que viajam para países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) devem ser isentadas da vacinação pelo médico assistente, se não houver risco de contrair a infecção. É contraindicada em nutrízes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por pelo menos 15 dias e preferencialmente por 30 dias após a imunização. | SIM | SIM | |
| Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) | Não vacinar na gestação. | <ul style="list-style-type: none"> Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. | SIM, para puérperas de até 49 anos | SIM, para puérperas | |
| HPV | Não vacinar na gestação. Se a mulher tiver iniciado esquema antes da gestação, suspendê-lo até puerpério. | <ul style="list-style-type: none"> Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. | NÃO | SIM, para puérperas | |
| Varicela (catapora) | Não vacinar na gestação. | <ul style="list-style-type: none"> Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. | NÃO | SIM, para puérperas | |
| Dengue | Não vacinar na gestação. | <ul style="list-style-type: none"> Contraindicada para mulheres amamentando. | NÃO | NÃO | |